



TERPENOL

ASPECTO	OBSERVACIONES
TIPO	Insecticida de amplio espectro de origen vegetal
INGREDIENTE ACTIVO	Alicina, capsaicina, citronelol, eugenol y otros metabolitos
GRUPO QUIMICO	Extracto vegetal
CONCENTRACION Y FORMULACION	0,07 g/L + 0,03 g/L (Concentrado Soluble en parafina)
MODO DE ACCION	Contacto
FABRICANTE / FORMULADOR	GRUPO TECNOTERRA SAS
TOXICIDAD	Grupo IV Ligeramente tóxico
	LD50 producto comercia:
	* Oral: No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5.000 mg/kg de peso vivo en ratas.
	* Dermal: No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5.000 mg/kg de peso vivo en ratas.
	Etiqueta con franja de color VERDE
	Palabra: PRECAUCIÓN
ANTIDOTO	No existe antídoto específico.

RECOMENDACIONES DE USO				
Cultivo	Problema	Dosis		Observaciones
		al suelo	al follaje	
PAPA	Gusano blanco Polilla guatemalteca Sinfilidos.		5-10 cc litro agua	Aplicar en la rejada en la siembra, en la desyerba, en el aporque. A los 45 días. A los 90 días. 1 los 120 días. Ideal para mezclar con productos para gusano blanco. Usar boquillas de alta descarga.
PASTOS	chinchas		5-10 cc litro agua	Aplicar en redondo en la zona donde este el ataque del chinche. Repetir a los 5 días. Con la dosis más alta.
AGUACATE, CITRICOS	Trips, ácaros, picudos Stenoma, heilipus. Mosca blanca.		5-10 cc litro agua	Usar boquillas de alta descarga.
HORTALIZAS, ORNAMENTALES.	Cogolleros, comedores follaje, trips, mosca blanca		5-10 cc litro agua	Usar boquillas de alta descarga. Hacer aplicaciones cada 5 días.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS	El insecticida TERPENOL es un líquido emulsionado de extracto concentrado de ajo (<i>allium sativum</i>), ají (<i>capsicum annum</i>), azadiractina y otros extractos combinados con parafina y aceites que potencializan la acción de los metabolitos, aumentando su tiempo de duración y a su vez servir como adherente, con la ventaja de ser completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente. Ideal para el control del gusano blanco de la papa, la polilla guatemalteca y sinfilidos.
PREPARACION DE LA MEZCLA	Aplicación en corona en drench. Con alto caudal en lotes de papa con alta infestación de la plaga se recomienda usar la dosis más alta.
COMPATIBILIDA	TERPENOL es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.
FITOXICIDAD	TERPENOL no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.
PERIODOS DE CARENCIA	No hay restricción.
REINGRESO AL AREA TRATADA	No hay restricción.
TOLERANCIAS	No hay restricción.
PRESENTACION	1, 4, 10 y 20 litros

Leer antes de Usar este Producto ES UN PRODUCTO CIENTO POR CIENTO ECOLOGICO Y MUY UTIL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LAS PLAGAS