



ASPECTO	OBSERVACIONES
TIPO	Bactericida, biostático, fungicida.
INGREDIENTE ACTIVO	Solución clorada estabilizada en ácido orgánico
GRUPO QUIMICO	Cloro.
CONCENTRACION Y FORMULACION	90% SL (Concentrado Soluble)
MODO DE ACCION	Contacto, preventivo y curativo.
FABRICANTE / FORMULADOR	GRUPO TECNOTERRA SAS
TOXICIDAD	Grupo IV Ligeramente tóxico
	LD50 producto comercial:
	* Oral: No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5,00 mg/kg de peso vivo en ratas.
	* Dermal: No produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis 5.000 mg/kg de peso vivo en ratas.
	Etiqueta con franja de color VERDE
	Palabra: PRECAUCIÓN
ANTIDOTO	No existe antídoto específico.

RECOMENDACIONES DE USO				
Cultivo	Problema	Dosis		Observaciones
		al tallo		
Plátano y banano	Moko	300 CC por 10 lts de agua.		Aplicar 300 cc de BACTRIL en 10 litros de agua. Usar la bomba de espalda. Se coloca en la lanza una aguja para la mastitis. Realizar un palancazo al tercio medio de la planta hasta que el producto salga en la parte superior
	Mal de Panamá	30 cc por litro agua		Aplicar 300 cc de BACTRIL en 10 litros de agua. Usar la bomba de espalda. Se coloca en la lanza una aguja para la mastitis.
Gulupa, maracuyá, cítricos. aguacate.	Elefantiasis	30 cc por litro de agua.		Aplicar 300 cc de BACTRIL en 10 litros de agua. Usar la bomba de espalda. Se coloca en la lanza una aguja para la mastitis.
	Fusarium, rizoctonia.	300 cc bomba		Injectar al suelo en drench. A los 15 días aplicar microbiol para restablecer la microbiota.

PRINCIPALES CARACTERISTICA	BACTRIL es un bactericida a base de una solución clorada y estabilizado en ácido orgánico. Ideal en la prevención y control de moko (Ralstonia solanacearum), Mal de Panamá y elefantiasis (Fusarium sp)
PREPARACION DE LA MEZCLA	Colocamos 10 litros de agua en la bomba de espalda y adicionamos 300 cc de BACTRIL. Luego insertamos la aguja dentro del pseudo-tallo a nivel del pecho o la cintura y hacemos un palancazo hasta que el producto salga en la parte superior.
COMPATIBILIDAD	SE DEBE APLICAR SOLO. USAR GUANTES CARETA Y TAPABOCAS.
FITOXICIDAD	Ninguna
PERIODOS DE CARENCIA	No hay restricción.
REINGRESO AL AREA TRATADA	No hay restricción.
TOLERANCIAS	No hay restricción.
PRESENTACION	1, 4, 10 y 20 litros

LEER ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO